

Anlage 1

Tab. 2: Vogelarten für die Gebietsauswahl gem. Art. 4.1 und 4.2 VS-RL: Entwicklung des Rote-Liste-Status seit 1981

Vogelart	Gefährdungskategorie Rote Liste & Bestandszahlen						Trend 1981-2004	MZEG in % Land	TEG in % Land	MZEG in % Soll	Gebiete
	3. Fassung 1981	Bestand (BP) 1980	4. Fassung 1996	Bestand (BP) 1995	5. Fassung 2005	Bestand (BP) 2002-2004					
<b>a) Artikel 4.1</b>											
Rohrdommel	1	max. 1	1	max. 1 (-2)	0	0		ohne		Altgebiete	ungenügend
Zwergdommel	1	< 100	1	20-30	1	20-30	↓ 2	80	80-100	100	(++)
Nachtreier	B.2	-	1	-	-	0		ohne		100	DD
Purpurreiher*	2	< 15	1	max. 15	R	18-23	↑ 2	60	80-100	60*	ok
Weißstorch	1	20	1	137	V	274	↑ 2	20	20-30		ok
Schwarzstorch	0	-	0	-	2	1-2		60	80-100		DD
Moorente*	B.2	- / EP	1	- / EP	2	1-5	↑ 1	80	80-100	60*	ok
Wespenbussard	3	ca. 500	3	300	3	200-350	↓ 1	20	50-60	80	ungenügend
Schwarzmilan	4	ca. 200	3	300	-	750	↑ 1	ohne	<b>DZ</b>		DD
Rotmilan	3	ca. 250	3	250	-	1050	↑ 2	ohne	<b>DZ</b>		DD
Rohrweihe	1	ca. 30	1	30-40	3	30-50	0	20	80-100	100	(++)
Kornweihe	1	1-2	1	0-2	1	1-2	0	ohne		100	DD
Wiesenweihe	1	1-5	1	1-5	2	5-6		60	80-100		ok
Wanderfalke	1	ca. 40	2	ca. 230	-	293	↑ 2	60	70-80		ok
Haselhuhn*	1	ca. 400 Ex.	1	ca. 70 Paare	1	30-70 Ex.	↓ 2	80	80-100	100	(++)
Auerhuhn*	1	ca. 500 Hähne	2	550 Hähne	1	max. 300 Hähne	↓ 2	80	80-100	100	(++)
Tüpfelsumpfhuhn	1	ca. 20	1	10-20	1	10-20	↓ 2	80	80-100	100	(++)
Kleines Sumpfhuhn	B.2	-	4	- / EP	-	0		ohne		100	DD
Wachtelkönig	1	< 100	1	10-20	1	10-50	↑ 1	ohne		100	DD
Schwarzkopfmöwe*	-	-	1	- / EP	R	20-40		80	80-100	60*	ok
Flussseeschwalbe	1	< 50	1	90-100	V	216-218	↑ 2	60	80-100		DD
Uhu	1	ca. 10	1	30	-	50-70	↑ 2	60	80-100		ok
Sumpfhöhreule	1	1-25 (n.allj.)	1	1-25 (n.allj.)	0	0		ohne		Altgebiete	ungenügend
Sperlingskauz*	1	< 5	2	150	-	150-200	↑ 2	20	70-80	60*	ok
Rauhfußkauz	2	ca. 75	2	150-200	V	200-350	↑ 2	20	50-60		ok
Ziegenmelker	2	ca. 100	1	ca. 20	1	20-25	↓ 2	80	80-100	100	(++)
Eisvogel	2	ca. 200	2	300-400	V	300-400		20	60-70		ok
Blauracke*	0	-	0	-	0	-		ohne		Altgebiete	ungenügend
Grauspecht	-	-	V	5800	V	4000-6000	↓ 1	ohne		80	DD
Schwarzspecht	4	ca. 1000	V	4800	-	4000-5500		ohne			DD
Weißrückenspecht*	0	-	0	-	R	4-8		60	80-100	60*	ok
Mittelspecht	3	ca. 1000	2	2000	V	2000-2500		ohne	<b>DZ</b>		DD
Dreizehenspecht*	1	1-2	1	10-15	2	20-30	↑ 2	80	80-100	60*	ok
Brachpieper	1	< 10	1	1-5	0	0		ohne		Altgebiete	ungenügend
Heidelerche	1	< 500	1	130-150	1	100-150	↓ 2	20	80-100	100	(++)
Blauehlchen	1	ca. 100	2	150-220	-	200-300	↑ 2	20	70-80		ok
Halsbandschnäpper*	-	?	2	3000	3	2500-3500	?	20	30-40	60*	ungenügend
Neuntöter	2	ca. 1500	3	12000	V	10000-12000	?	ohne			DD
Ortolan*	1	ca. 10	0	0	1	1	↓ 2	ohne		Altgebiete	DD
<b>b) Artikel 4.2</b>											
Zwergtaucher	3	ca. 2000	2	500-600	2	500-600	↓ 2	20	70-80	100	ungenügend
Schwarzhalstaucher	1	ca. 50	1	100-120	V	100-200	↑ 2	20	80-100		ok
Löffelente	2	3-5	2	5-15	2	5-15	0	60	80-100		ok
Krickente	2	ca. 50	1	75-90	1	50-70	↓ 2	60	80-100	100	(++)
Knäkente	2	ca. 50	1	40-50	1	30-50	↓ 2	80	80-100	100	(++)
Kolbenente*	2	ca. 40	2	400	-	370-430	↑ 1	60	60-70	60*	ok
Tafelente	2	ca. 100	2	80	2	80-90	↓ 1	60	80-100	80	ok
Gänsesäger*	0	-	1	5	2	10		20	30-40	60*	ungenügend
Baumfalke	2	100-150	2	200	3	200-300	0	20	40-50		ok
Wachtel	2	< 1000	2	2000	-	1000-3000		ohne			DD
Wasserralle	2	< 2000	2	800	2	600-900	↓ 2	20	60-70	100	ungenügend
Kiebitz	-	-	4	4000-5000	2	2000-3000	↓ 2	ohne		100	DD
Bekassine	1	ca. 150	1	70-90	1	35-50	↓ 2	60	80-100	100	(++)
Großer Brachvogel	1	ca. 150	1	85-90	1	48-50	↓ 2	80	80-100	100	(++)
Flussuferläufer	1	ca. 15	1	ca. 6	1	0-6	↓ 2	ohne		100	DD
Hohltaube	2	600	2	4000	V	3000-4000	?	ohne			DD
Bienenfresser*	1	< 10	1	30-40	V	154	↑ 2	20	70-80	60*	ok
Wiedehopf	2	ca. 50	1	20	2	55-60	↑ 2	60	70-80		ok
Wendehals	3	< 1000	2	7000	2	4000-6000	↓ 1	ohne	<b>DZ</b>	80	DD
Schafstelze	3	< 1000	2	6000	-	5000-7000		ohne			DD
Braunkehlchen	2	< 500	2	2000	2	1000-1500	↓ 2	20	30-40	100	ungenügend
Schwarzkehlchen	2	< 300	2	250	-	350-450	↑ 2	20	80-100		ok
Steinschmätzer	2	< 400	1	70-80	1	40-50	↓ 2	60	60-70	100	ungenügend
Ringdrossel*	-	?	4	500	V	900-1100	?	20	60-70	60*	ok
Schlagschwirl*	-	?	4	1-5	R	1-10	0	60	80-100	60*	ok
Drosselrohrsänger	1	ca. 100	1	70-80	1	50-90	↓ 1	60	80-100	100	(++)
Schilfrohrsänger	1	ca. 50	1	3-5	1	5-20	↓ 2	20	80-100	100	(++)
Orpheusspötter*	-	-	4	20	R	20-30	↑ 2	60	80-100	60*	ok
Berglaubsänger*	4	< 5000	2	900	1	400-500	↓ 2	20	20-30	100	ungenügend
Beutelmeise*	4	< 5	4	50-75	-	30-40	0	60	80-100	60*	ok
Raubwürger	1	ca. 300	1	60-80	1	20-30	↓ 2	60	60-70	100	ungenügend
Rotkopfwürger*	1	250	1	10-15	1	1-5	↓ 2	ohne		100	DD
Zitronengirlitz*	2	ca. 500	3	800	2	400-500	↓ 2	20	60-70	100	ungenügend
Grauammer	3	< 1000	2	800-1000	2	500-800	↓ 2	ohne	<b>DZ</b>	100	DD
Zippammer*	1	< 50	1	40	1	30-40	↓ 1	60	80-100	100	(++)
Zaunammer*	1	< 50	1	40-50	1	30-40	↓ 1	60	60-70	100	ungenügend